

Gastroenterologie
Dr. med. Stefan Bauer, Leitender Arzt
Fon: 034 421 23 10
Fax: 034 421 23 35
Mail: gastro-rse@hin.ch
EAN: 760 1000 145 499
Regionalspital Emmental
3400 Burgdorf
www.rs-e.ch

**PNEUMOLOGIE**
GASTROENTEROLOGIE
am RSE BURGENDORF

Burgdorf,

Sehr geehrte/r Frau/Herr

Sie sind für eine **AMBULANTE DICKDARMSPIEGELUNG** angemeldet. Dürfen wir Sie bitten, sich am

um

Uhr

auf dem **Sekretariat Gastroenterologie** am Regionalspital Emmental Burgdorf zu melden (folgen Sie vom Haupteingang den grünen Pfeilen am Boden). Bitte bringen Sie Ihre **Krankenkassen-Karte** mit.

Die **Spiegelung** selbst dauert voraussichtlich **½ bis 1 Stunde**. Mit Vor- und Nachbetreuung rechnen Sie aber mit insgesamt **1½ - 2 Stunden**.

Für diese Untersuchung ist eine Vorbereitung Ihres Dickdarms nötig. Essen Sie bitte ab **3 Tagen** vor der Untersuchung **ballaststoffarme Kost** (keine rohen Gemüse, Pilze, Salate, Früchte mit Kernen oder Schalen, Kiwi, Müesli, Vollkornprodukte). Falls Sie **Eisentabletten** einnehmen, sollten Sie diese ab 3 Tage vor der Untersuchung **weglassen**.

Am **Tag vor der Untersuchung leicht verdauliches Frühstück** (Kaffee oder Tee, Weissbrot mit Butter und Gelée/Honig). Am **Mittag** Zwieback, Bouillon ohne Beilagen, andere Flüssigkeiten.

Ab **12.00 Uhr** mittags sollten Sie **nichts mehr essen**. Klare Getränke wie Tee, Kaffee (mit wenig Milch, mit oder ohne Zucker), Mineralwasser und Bouillon ohne Beilagen sind bis zum Untersuchungstermin erlaubt.

Die durch das Abführen bedingten häufigen Stuhlentleerungen können zu einer **Reizung des Darmausganges** führen. Wir empfehlen die **vorsorgliche Anwendung** einer **schützenden Salbe** wie Nivea[®]-Crème, Bepanthen[®]-Crème/Salbe, Penaten[®]-Crème, Excipial[®]-Crème/Fettcrème, Pelsano[®]-Salbe.



Sie erhalten **2 Fläschchen** eines Abführmittels (**Colophos[®]**).

Nehmen Sie bitte das **erste** am **Vortag** der Untersuchung **um 17.00 Uhr ein**.
Nehmen Sie bitte das **zweite** am **Morgen** des **Untersuchungstages um 06.00 Uhr ein**.

Trinken Sie nach dem ersten und dem zweiten Fläschchen Colophos[®] **je etwa 2 Liter alkoholfreie klare Flüssigkeit (1 Liter pro 1 Stunde)**, am ehesten Wasser oder Tee.

Falls Sie regelmässig Medikamente einnehmen, verschieben Sie deren Einnahmezeitpunkt bis 4 Stunden nach der letzten Einnahme der Abführlösung.

Aspirinartige Medikamente, Rheumamittel und Plavix[®] hemmen die Blutplättchenfunktion und können das Blutungsrisiko erhöhen. **Falls ohne Bedenken möglich sollten aspirinartige Medikamente sowie Plavix[®] 7 Tage und Rheumamittel 4 Tage vor der Untersuchung abgesetzt werden.** Fragen Sie bitte Ihren **Hausarzt**, ob entsprechende Medikamente pausiert werden können. Paracetamolhaltige Schmerzmittel (Acetalgin[®], Dafalgan[®], Panadol[®], Ben-u-ron[®], Influbene[®], Kafa[®]) hemmen die Blutplättchenfunktion nicht und müssen nicht abgesetzt werden. Falls Sie eine **Blutverdünnung mit Marcoumar[®] oder Sintrom[®]** haben, so wird der Hausarzt die notwendigen Massnahmen bestimmen, um auf den Untersuchungszeitpunkt hin eine genügende Blutgerinnung zu erreichen.

In der Regel werden wir Ihnen für diese Untersuchung ein Medikament zur Entspannung und Darmerschläffung intravenös verabreichen. **Sie dürfen am Untersuchungstag nach der Untersuchung deshalb nicht selber ein Motorfahrzeug lenken.**

Falls Sie diesen Termin nicht einhalten können, oder wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an (Tel. 034/421 23 10).

Mit freundlichen Grüssen

Sekretariat Gastroenterologie am Regionalspital Emmental Burgdorf